Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN xxx-xxxx, Artikelnummer xxxxxxxx
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn;

HSLF-FS 2026:

Utkom från trycket den x månad 2026

beslutade den dag månad 2026.

Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 7 g och 12 §§ smittskyddsförordningen (2004:255) att 5 och 7 §§ Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska ha följande lydelse.

5 § Barn ska erbjudas vaccination enligt följande schema:

	Barnhälsovård						**Elevhälsa**		
Ålder	6 veckor	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5 år	-	-	-
Årskurs	-	-	-	-	-	-	1–2	5	8–9
Rotavirus	Dos 1	Dos 2	Dos 3*	-	-	-	-	-	-
Difteri	-	Dos 1	Dos 2	Dos 3	-	Dos 4	-	-	Dos 5
Stelkramp	-				-		-	-	
Kikhosta	-				-		-	-	
Polio	-				-		-	-	-
Haemophilus influenzae typ b	-				-	-	-	-	-
Pneumokocker	-	Dos 1	Dos 2	Dos 3	-	-	-	-	-
Mässling	-	-	-	-	Dos 1	-	Dos 2	-	-
Påssjuka	-	-	-	-		-		-	-
Röda hund	-	-	-	-		-		-	-
Vattkoppor	-	-	-	-	Dos 1	-	Dos 2	-	-
Humant papillom-virus	-	-	-	-	-	-	-	Dos 1+2	-

7 § Vid vaccination enligt vaccinationsschemat i 5 § och vid kompletterande vaccination enligt 6 § ska följande begränsningar och tidpunkter tillämpas:

–Vaccination mot vattkoppor ska erbjudas barn födda från och med den 1 juli 2025.

– Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker ska endast erbjudas barn upp till 6 års ålder.

– Första dosen vaccin mot rotavirus ska ges före 12 veckors ålder och den andra dosen ska ges före 16 veckors ålder.

– Andra dosen vaccin mot rotavirus får ges tidigast 4 veckor efter den första dosen. Om vaccinationen ges i tre doser får den tredje dosen vaccin mot rotavirus ges tidigast 4 veckor efter den andra dosen.

– Första dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges från 2,5 månaders ålder.

– Andra dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges tidigast 6 veckor efter den första dosen och den tredje dosen får ges tidigast 6 månader efter den andra dosen.

– Fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio får ges tidigast 3 år efter den tredje dosen.

– Femte dosen vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta får ges tidigast 5 år efter den fjärde dosen.

– Första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund samt vaccin mot vattkoppor får ges från 12 månaders ålder.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2027.

Folkhälsomyndigheten

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn efternamn